



FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

Wescohex jabón 2%
Jabón antiséptico

DESCRIPCIÓN GENERAL

Jabón antiséptico compuesto por un 2% de gluconato de Clorhexidina, concentración que permite garantizar la remoción en corto tiempo de la carga microbiana presente en la piel, eliminando de esta manera los riesgos de transmisión de infecciones.

REGISTRO Y VIGENCIA

Colombia: 2021M-0016758-R1

ASPECTO

Líquido naranja

COMPOSICIÓN

Gluconato de clorhexidina.....2%

MECANISMO DE ACCIÓN

La clorhexidina genera disrupción en la membrana y precipitación del contenido celular.

ACTIVIDAD MICROBIOLOGICA

Microorganismo	Tiempo de contacto	Reducción
<i>Staphylococcus aureus</i> (ATCC 6538)		
<i>Escherichia coli</i> (ATCC 8739)		
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (ATCC 15442)		
<i>Salmonella typhimurium</i> (ATCC 14028)		
	30 seg	99.9%

VIDA UTIL

2 años

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Efectivo contra bacterias.
- Prolongado efecto residual.
- Disminuye el riesgo de reacciones adversas en la piel.
- Dosis única para el paciente
- Cero desperdicios
- Disminución de costos por reenvase, esterilización y mano de obra especializada.

RECOMENDACIONES DE USO

- Lavado quirúrgico

MODO DE USO

Unidosis

- Delimita el área a tratar con el antiséptico.
- Aplique el jabón usando una técnica adecuada
- Garantice un tiempo de aplicación entre 1 y 2 minutos.
- Retire con suficiente agua estéril

Jabón antiséptico

Agregar la cantidad suficiente de producto para cubrir el área de las manos y seguir la técnica sugerida por la Organización Mundial de la Salud. Solo de esta manera se puede garantizar que las manos sean seguras para la prestación de la asistencia al paciente (WHO, 2009).

RECOMENDACIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite la ingesta o contacto con los ojos.
- No mezcle con otros productos.
- Para más información, remítase a la hoja de seguridad (MSDS) o solicite asesoría de nuestros Representantes Técnico Comerciales.



FICHA TÉCNICA

PRIMEROS AUXILIOS

- Contacto con los ojos:

En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua al menos 15 minutos, levante y separe los párpados para asegurar la remoción del producto, si la irritación persiste consultar con el médico.

- Ingestión:

En caso de ingestión enjuagar la boca, suministrar abundantes cantidades de agua y no inducir el vómito, consultar al médico inmediatamente. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.

ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN

- El producto debe permanecer dentro de su envase original, cerrado y a una temperatura no mayor de 30°C. No exponga a la luz del sol. Una vez consumido el producto, rasgue la etiqueta, y deseche en el contenedor asignado.
- No descargue el producto en afluentes, lagos, arroyos, estanques, estuarios, océanos u otras fuentes de agua, a menos que se cumpla con los requisitos de los sistemas nacionales de eliminación de contaminantes.

PRESENTACIONES

Unidosis (30 mL, 60 mL 120 mL)

Bolsa descartable (850 mL)

rígido (500 mL, 3.785 mL)

PARTIDA ARANCELARIA

30.04.90.29.00